

2015년 04월 19일 시행  
제1회 임상심리사 2급 실기 기출문제

1. 아래의 MMPI 검사 결과에 근거하였을 때, 진단명과 진단이유를 기술하시오.  
(L, K 척도는 낮고 F척도는 100 이상이며 임상척도 1, 2, 4, 높게 나타났으며 특히 6, 7, 8이 높게 나옴)  
(4점)
  
2. MMPI 검사에서 임상척도 4-9번 척도가 높을 때 심리적인 특징 4가지를 기술하시오.  
(4점)
  
3. Beck의 인지적 왜곡 6가지를 쓰고 설명하시오.  
(6점)
  
4. 전이와 역전이를 설명하시오.  
(4점)
  
5. MMPI 검사의 일반적인 해석 단계를 쓰시오<sup>1)</sup>.  
(단, 임상척도와 타당도 척도로써 재구성척도와 내용척도는 제외함)  
(6점)

1) 1단계는 적어주고 나머지 6개 쓰는 문제였음

6. 사회성숙도 검사의 6가지 영역<sup>2)</sup>을 기술하시오.

(6점)

7. 다음의 내담자 사례 경우 진단명과 증상 징후, 평가하시오.

- 1) 김〇〇가 수시로 서울로 올라갔던 것은 대학생 때 짝사랑했던 여학생이 데이트를 하자고 하는 소리가 들렸기 때문이다.
- 2) “특수 국가기관에서 CCTV와 위성으로 24시간 나를 감시하고 있어요. 조만간 나를 죽이러 올 거예요.”
- 3) “나는 하나님의 아들이다. 모두 내 앞에 무릎을 꿇어라. 내가 너희를 구원하리라”

(5점)

8. 공포대상에 대한 체계적 둔감화의 순서를 쓰고 설명하시오.

(6점)

9. MMPI 검사 결과, L척도와 K척도는 30이고 F가 70일 때 상태 2가지를 쓰시오.

(4점)

10. 시간제한적 집단치료(단기집단치료)의 주요 특징을 기술하시오.

(6점)

---

2) 암기법 : 성숙도가 낮은 의사가, 높은 인자 때문에 스스로(자조) 자작하였다.

11. 내담자 반응을 해석할 때 치료자의 주의사항 5가지를 기술하시오.

(5점)

12. 단기상담이나 응급상담의 원리나 기술 5가지를 쓰시오.

(5점)

13. 자폐스펙트럼 장애 진단기준 중 사회적 의사소통의 상호작용 결함 2가지 적고 DSM-5의 장애명칭 2가지를 쓰시오.

(4점)

14. 놀이치료는 놀이가 치료적 가치가 있다. 놀이의 치료적 가치 3가지를 기술하시오.

(3점)

15. Exner 종합체계 중요채점법(로샤 검사) 중 5가지를 기술하시오.

(5점)

16. 병리, 손상, 장애, 핸디캡을 구분하여 설명하시오.

(4점)

17. MMPI-2에서 1번 척도가 상승하였을 때 성향이나 상태 3가지를 기술하시오.

(3점)

18. 만성정신질환자를 위한 정신사회재활의 일반적 목표 3가지를 기술하시오.

(3점)

19. 김 대리의 사례에서 REBT의 ABCDE 치료과정에 맞추어 설명하시오.<sup>3)</sup> (5점)

김 대리는 업무능력이 높고 남보다 승진이 빠르다. 그러나 사소한 실수를 했다. 상사나 다른 동료들은 아무렇지 않다고 말했지만, 김 대리는 아니었다. 김 대리는 “실수하면 안 된다. 실수하면 회사생활은 끝이다” 라는 생각을 했고, 심리적 혼란을 겪었다. 그래서 전직을 위해 상담자를 찾았다. 상담자는 REBT기법으로 김 대리를 상담하면 될 것 같아 그렇게 하기로 했다.

20. 단기상담에 적합한 내담자의 특징을 5가지를 기술하시오.(심리상담)

(5점)

---

3) 답 칸에 ABCDE가 순서대로 기재되어 있었음