

12. 정신역동적 관점의 학자들과 그 설명이 틀린 것은?

- ① Freud는 정신결정론과 무의식적 동기를 강조한다.
- ② Jung은 집단무의식의 중요한 구성요소를 원형이라 가정한다.
- ③ Adler는 생물학적 측면보다는 사회적 요인이 성격에 미치는 영향을 강조한다.
- ④ Sullivan은 3가지 성격요소 중 어느 한 요소가 지배적이고 다른 두 요소가 조화를 이룰 때 문제가 발생한다고 가정한다.

13. Janis의 집단사고의 원인이 아닌 것은?

- ① 강한 응집성
- ② 성급한 만장일치 촉구
- ③ 판단에 대한 과도한 확신
- ④ 구성원의 낮은 지적 수준

14. 사회학습이론에 입각한 성격에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사회학습이론에서는 성격이 인지과정이나 동기에 의한 영향을 인정하지 않는다.
- ② 사회학습이론에서는 관찰학습과 모델링을 통해서 보상받은 행동을 대리적으로 학습한다고 한다.
- ③ 사회학습이론에서는 행동에 대한 환경적 변인의 독립적인 영향을 강조한다.
- ④ Bandura는 개인이 자신의 노력으로 원하는 결과를 얻을 수 있다는 신념이나 기대를 자기존중감(self-esteem)이라고 하였다.

15. 다음 중 성격이 다른 학습은?

- ① 연합학습
- ② 통찰학습
- ③ 잠재학습
- ④ 모방학습

16. 자유 회상 실험을 통해 얻은 계열 위치 곡선의 시사점과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 최신(신근) 효과
- ② 초두 효과
- ③ 장기기억의 지속 시간
- ④ 단기기억과 장기기억의 이중적 기억 체계

17. 연구자가 검사의 예측능력에 관심이 있을 때 가장 고려해야 하는 타당도의 유형은?

- ① 내용 타당도
- ② 안면 타당도
- ③ 준거 타당도
- ④ 구성 타당도

[제2과목 : 이상심리학]**21. 행동주의적 입장에서 보는 이상행동으로 틀린 것은?**

- ① 비정상적인 성격발달도 유전적 소인과 경험 간 상호작용의 결과로 본다.
- ② 우울증은 부분적으로는 행동이 더 이상 보상을 받지 못하는 소거의 결과로 본다.
- ③ 행동주의자들은 진단범주에 따라 환자들을 명명하는 것에 회의적이다.
- ④ 행동주의자들은 모든 심리적 이상이 오로지 학습되었다고 본다.

22. 다음에서 설명하고 있는 것은?

신경성 식욕부진증 환자들이 사회적 및 신체적 문제들에도 불구하고 절식행동과 과도한 운동을 하는 생물학적 이유를 설명하기 위해 제안된 것으로서, 굶는 동안 엔돌핀 수준이 증가하여 긍정적 정서를 체험함으로써 신경성 식욕 부진증적 행동이 강화된다.

- ① 상호억제원리
- ② Premack의 원리
- ③ 신해리이론
- ④ 자가중독이론

23. 다음 보기에서 이 환자의 감별진단이 필요한 정신과적 진단들로 알맞은 것은?

65세의 남자가 3개월 전 직장을 그만둔 후 "자꾸 깜박깜박 해요"라는 기억력 감퇴를 호소하며 병원에 찾아 왔다. 환자는 물건을 두고도 잘 찾지 못하고 방금 들은 말도 잊어버리는 일이 많아졌다고 하며 책을 읽어도 내용이 머릿속에 잘 들어오지 않는다고 하였다. 부인에 의하면 이전에 부지런하고 깔끔한 성격이었던 환자가 위생상태에도 신경을 쓰지 않고 누워만 있는 등 상당히 게을러졌다고 한다.

- ① 섬망, 우울증
- ② 치매, 우울증
- ③ 섬망, 치매
- ④ 치매, 스트레스 장애

24. 성격장애에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① DSM-5에서 10가지 성격장애로 구분된다.
- ② 고정된 행동 양식이 사회적, 직업적, 그리고 다른 중요 영역에서 임상적으로 심각한 고통이나 기능장애를 초래해야 한다.
- ③ 개인의 지속적인 내적 경험과 행동양식이 그가 속한 사회의 문화적 기대에서 심하게 벗어나야 한다.
- ④ 발병 시기는 성인기 이후여야 한다.

25. 지적장애(intellectual disability)의 진단적 특징으로 틀린 것은?

- ① 임상적 평가와 개별적으로 실시된 표준화된 지능 검사로 확인된 지적기능의 결함이다.
- ② 적응기능의 결함으로 인해 독립성과 사회적 책임의식에 필요한 발달학적 사회문화적 표준을 충족하지 못한다.
- ③ 20세 이전에 발병한다.
- ④ 지적 결함과 적응기능의 결함은 발달시기동안에 시작된다.

26. 지적장애(intellectual disability) 진단과 관련된 세 가지 영역에 해당되지 않는 것은?

- ① 개념적 영역(conceptual domain)
- ② 사회적 영역(social domain)
- ③ 발달적 영역(developmental domain)
- ④ 실행적 영역(practical domain)

27. 정신분석학적 관점에서 볼 때 해리성 장애 환자들에게서 가장 흔히 나타나는 방어기제는?

- ① 억압
- ② 반동형성
- ③ 전치
- ④ 주지화

28. 양극성 장애에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조증 상태에서는 사고의 비약 등의 사고장애가 나타난다.
- ② 우울증 상태에서는 자살을 시도하기도 한다.
- ③ 조증은 서서히, 우울증은 급격히 나타난다.
- ④ 조증과 우울증이 반복되는 장애이다.

29. DSM-5에 근거한 주요 우울증 일화의 준거가 아닌 것은?

- ① 사고의 비약
- ② 정신운동성 지체
- ③ 자기비하
- ④ 주의집중장애

30. 우울증의 임상양상과 원인 등의 양분된 차원으로 틀린 것은?

- ① 조발성 우울과 만발성 우울
- ② 정신병적 우울과 신경증적 우울
- ③ 내인성 우울과 반응성 우울
- ④ 지체성 우울과 초조성 우울

36. 다음 이상행동의 원인을 다음과 같이 설명하는 이론은?

- 인간의 감정과 행동은 객관적, 물리적 현실보다 주관적, 심리적 현실에 의해서 결정된다.
- 정신장애는 인지적 기능의 편향 및 결손과 밀접하게 연관되어 있다.

- | | |
|----------|-----------|
| ① 정신분석이론 | ② 행동주의 이론 |
| ③ 인지적 이론 | ④ 인본주의 이론 |

37. 병적 도벽에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개인적으로 쓸모가 없거나 금전적으로 가치가 없는 물건을 훔치려는 충동을 저지하는데 반복적으로 실패한다.
- ② 훔치기 전에 고조되는 긴장감을 경험한다.
- ③ 훔친 후에 기쁨, 충족감, 안도감을 느낀다.
- ④ 분노나 복수를 하기 위해서 훔친다.

38. 공황장애의 특징을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 어지럼증
- ㄴ. 몸이 떨리고 땀 흘림
- ㄷ. 호흡이 가빠지고 숨이 막힐 것 같은 느낌
- ㄹ. 미쳐버리거나 통제력을 상실할 것 같은 느낌

- | | |
|-----------|--------------|
| ① ㄱ, ㄴ, ㄷ | ② ㄷ, ㄹ |
| ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ | ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ |

39. 알콜중독과 가장 관련이 깊은 정신장애들만으로 짝지은 것은?

- ① 치매, 공포장애, 우울장애
- ② 치매, 허위성장애, 해리성 기억상실증
- ③ 우울장애, 성격장애, 조현병
- ④ 성격장애, 적응장애, 신체형장애

40. 다음 장애 중 성기능부전에 포함되지 않은 것은?

- | | |
|----------|-----------|
| ① 사정지연 | ② 발기장애 |
| ③ 마찰도착장애 | ④ 여성극치감장애 |

[제3과목 : 심리검사]

41. 웨슬러지능검사로 평가할 수 있는 지능의 영역과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 추상적 사고능력
- ② 예술적 능력
- ③ 공간적 추론능력
- ④ 주의집중력

42. 뇌기능이론에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국재화(localization)는 어떤 인지기술이 뇌의 특정 영역에 자리잡고 있다는 것이다.
- ② 등력성주의(equipotentialism)는 뇌 영역이 한 가지 이상의 기능을 수행한다고 주장한다.
- ③ 뇌 손상 후에 나타나는 부분적인 기능회복은 등력성의 지지증거이다.
- ④ 뇌 손상 후에 나타나는 부분적인 기능회복은 국재화의 지지증거이다.

43. 아동용 시지각-운동통합의 발달검사로, 24개의 기하학적 형태의 도형으로 이루어진 지필검사는?

- ① VMI
- ② BGT
- ③ CPT
- ④ CBCL

44. 진로발달검사(CDI)의 하위 척도에 포함되지 않는 것은?

- ① 진로계획(CP)
- ② 진로탐색(CE)
- ③ 의사결정(DM)
- ④ 경력개발(CD)

45. 표준점수에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대표적인 표준점수로는 Z 점수가 있다.
- ② 표준점수는 원점수를 직선변환하여 얻는다.
- ③ 웨슬러지능검사의 IQ 수치도 일종의 표준점수이다.
- ④ Z 점수가 0점이라는 것은, 그 사례가 해당 집단의 평균치보다 1표준편차 위에 있다는 것을 의미한다.

46. 아동을 대상으로 집-나무-사람 그림검사를 실시할 때 그 실시 방법으로 옳은 것은?

- ① 아동의 보호자가 옆에서 지켜보면서 격려하도록 한다.
- ② 집, 나무, 사람은 각각 별도의 용지를 사용하여 실시한다.
- ③ 그림을 그린 다음에는 수정하지 못하게 한다.
- ④ 그림이 완성된 후 보호자에게 사후 질문을 하는 것이 일반적이다.

47. 직업선호도검사(VPT)의 코드유형 중 다음은 어느 유형에 대한 설명인가?

현장에서 몸으로 부대끼는 활동을 좋아한다. 사교적이지 못하며, 대인관계가 요구되는 상황에서 어려움을 느낀다.

- | | |
|----------|----------|
| ① 현실형(R) | ② 탐구형(I) |
| ③ 관습형(C) | ④ 진취형(E) |

48. MMPI-2의 각 척도에 대한 해석으로 가장 적합한 것은?

- ① 1번 척도는 다양하고 모호한 신체적 임상 증상과 연관성이 높다.
- ② 2번 척도는 반응성 우울증 보다는 내인성 우울증과 관련이 높다.
- ③ 4번 척도의 상승 시 심리치료 동기가 높고 치료의 예후가 좋을 것으로 나타낸다.
- ④ 7번 척도는 불안 가운데 상태불안 증상과 연관성이 높다.

49. 심리검사를 위한 면담에서 임상심리사가 유의해야 할 점과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수검자의 부적응 행동의 과거력을 잘 물어보아야 한다.
- ② 면담은 되도록 간단하게 진행해서 빨리 끝내야 한다.
- ③ 평가 목적(의뢰 사유)을 정확히 파악하고 이에 대한 답을 찾으려 해야 한다.
- ④ 수검자와 의사소통 관계(라포)를 잘 형성한 후 물어보아야 한다.

50. 초등학교 학생의 성취도를 알아보기 위하여 평가를 실시하고자 한다. 성취도 검사의 범주에 포함되지 않는 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 독해검사 | ② 쓰기검사 |
| ③ 산수검사 | ④ 지능검사 |

51. 심리검사의 제작에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 평균이 지나치게 한쪽으로 몰려 있거나 분산이 작은 경우는 정보가 낮아 좋은 문항이라고 하기 어렵다.
- ② 문항의 난이도가 높아질수록 개인의 능력을 변별할 수 있는 가능성이 늘어난다.
- ③ 오답을 정답으로 잘못 선택하는 확률은 각 오답 선택지별로 동질적인 것이 좋다.
- ④ 검사 점수의 변량이 작으면 검사의 신뢰도나 타당도는 낮아질 가능성이 크다.

52. MMPI-2 코드 쌍의 해석적 의미로 틀린 것은?

- ① 4-9 : 행동화적 경향이 높다.
- ② 1-2 : 다양한 신체적 증상에 대한 호소와 염려를 보인다.
- ③ 2-6 : 전환증상을 나타낼 경우가 많다.
- ④ 3-8 : 사고가 본질적으로 망상적일 수 있다.

53. 지능검사를 집단으로 실시하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전산화 심리검사로 개발되어 사용될 수 있다.
- ② 검사실시자의 훈련이 쉽다.
- ③ 개인의 특수한 행동에 관한 정보를 수집하기 쉽다.
- ④ 수검자의 일시적인 상태를 충분히 고려하지 못한다.

54. MMPI-2를 해석하는데 있어서 수검자의 검사태도 및 프로파일의 타당도를 알아보기 위해 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검사 수행에 걸린 시간
- ② 무응답의 개수
- ③ F척도의 상승도
- ④ 6번 척도의 변화폭

55. 표준화 검사의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검사 실시의 절차가 엄격히 통제된다.
- ② 모든 표준화 검사는 규준을 갖고 있다.
- ③ 반응의 자유도를 최대한으로 넓힌다.
- ④ 두 가지 이상의 동등형을 만들어 활용한다.

56. 지능의 측정 영역 중 일반적으로 연령이 증가함에 따라 가장 크게 저하되는 것은?

- ① 귀납적 추리 능력
- ② 공간위치파악능력
- ③ 수리능력, 지각속도
- ④ 언어능력, 언어기억

57. MMPI-2의 타당성 척도에 대한 해석으로 틀린 것은?

- ① 무반응(?) 점수가 100이상일 때는 채점에서 제외시킨다.
- ② 방어성 척도 중 L 점수가 높으면 사소한 결점이나 약점을 인정하는 태도를 보인다.
- ③ 비전형 척도 중 F 점수는 보통사람들과는 다른 생각(예, 정신병을 가진 사람), 이상한 태도, 이상한 경험을 가진 사람에게서 낮아지는 경향이 있다.
- ④ 방어성 척도 중 K 점수가 낮으면 방어적 태도가 낮아져 과도하게 솔직하고 자기 비판적임을 나타낸다.

58. 전두엽의 집행기능(executive function)을 평가 하기 위한 신경심리 검사와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 위스컨신 카드분류검사(WCST)
- ② 하노이 탑 검사(Tower of Hanoi test)
- ③ 보스턴 이름대기 검사(Boston Naming test)
- ④ 스트룹 검사 Stroop test)

59. BGT검사 실시에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 카드는 보이지 않게 엮어두고 도형 A부터 도형 8까지 차례로 제시한다.
- ② 카드에 제시된 도형 크기가 같게 그리게 한다.
- ③ 모사용지는 수검자가 원하는 만큼 사용하게 한다.
- ④ 수검자의 검사태도, 검사 행동을 잘 관찰한다.

60. 아동의 지적 발달이 또래 집단에 비해 지체되어 있는지, 혹은 앞서고 있는지를 평가하기 위해, Stem이 사용한 IQ산출계산방식은?

- ① 지능지수(IQ)= [정신연령/신체연령] × 100
- ② 지능지수(IQ)= [정신연령/신체연령] + 100
- ③ 지능지수(IQ)= [신체연령/정신연령] × 100
- ④ 지능지수(IQ)= [신체연령/정신연령] ÷ 100

[제4과목 : 임상심리학]**61. 생물학적 조망에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?**

- ① 행동과 기질적 기능간의 상호작용에 초점을 맞추고 있다.
- ② 마음과 몸은 하나의 복잡한 실체의 두 측면이다.
- ③ 심리적인 스트레스와 신체적인 질병은 서로 영향을 미치는 경우가 거의 없다
- ④ 관찰 가능한 표현형은 그 사람의 유전인자와 연관된 경험의 산물이다.

62. 현실치료에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 내담자가 더 현실적이고 실현 가능한 인생철학을 습득함으로써 정서적 혼란과 자기 패배적 행동을 최소화하는 것을 강조한다.
- ② 내담자의 좌절된 욕구를 알고 사람들과의 관계에서 새로운 선택을 함으로써 보다 성공적인 관계를 얻고 유지할 수 있음을 강조한다.
- ③ 현대의 소외, 고립, 무의미 등 생활의 딜레마 해결에 제한된 인식을 벗어나 자유와 책임능력의 인식을 강조한다.
- ④ 가족 내 서열에 대한 해석은 어른이 되어 세상과 작용하는 방식에 큰 영향이 있음을 강조한다.

63. 뇌의 편측화 효과를 측정할 수 있는 대표적 방법은?

- ① 미로검사
- ② 이원칭취기법
- ③ Wechsler 기억검사
- ④ 성격검사

64. 자신의 초기 경험이 타인에 대한 확장된 인식과 관계를 맺는다는 가정을 강조하는 치료적 접근은?

- ① 대상관계이론
- ② 자기심리학
- ③ 심리사회적 발달이론
- ④ 인본주의

65. 다음에서 설명하고 있는 것은?

전문적인 지식을 나누어줌으로써 어떤 사람이 노력하여 얻고자 하는 것의 효과를 증진시키는 과정이다.

- ① 자조
- ② 평가
- ③ 자문
- ④ 개입

1. Rorschach 검사의 모든 반응이 형태를 근거로 한 단조로운 반응이고, MMPI에서 8번 척도가 65T 이상으로 유의하게 상승되어 있는 내담자에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 우울한 기분, 무기력한 증상이 나타날 가능성이 크다.
- ② 망상, 환각이 나타나고 판단력이 저하되어 있을 가능성이 있다.
- ③ 타인을 믿고 신뢰하지 못하고 의처증 증상을 보일 가능성이 있다.
- ④ 회피성 성격장애의 특징을 보일 가능성이 있다.

72. 내담자와의 면접에서 중요한 기법 중 하나인 경청에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반응하기에 앞서 내담자가 말할 충분한 시간을 준다.
- ② 대수롭지 않은 내용을 말할 때는 도움이 될 만한 충고를 생각하며 듣는다.
- ③ 내담자와 자주 눈을 맞추고 주의를 기울인다.
- ④ 가능한 한 내담자의 말을 끊고 반응하는 행동을 하지 않는다.

73. 주로 과음, 흡연, 노출증 등의 문제를 해결하기 위해 활용되어지는 치료적 접근법은?

- ① 정신분석
- ② 체계적 둔감법
- ③ 혐오치료
- ④ 명상치료

74. 행동평가 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자연관찰은 참여자가 아닌 관찰자가 환경 내에서 일어나는 참여자의 행동을 관찰하고 기록하는 방법이다.
- ② 유사관찰은 제한이 없는 환경에서 관찰하는 방법이다.
- ③ 참여관찰은 관찰하고자 하는 개인이 자연스러운 환경에 관여하면서 기록하는 방식이다.
- ④ 자기관찰은 자신이 개인과 환경간의 상호작용에 관한 자료를 수집하도록 한다.

75. 인간 마음의 요소적 구조를 탐색하기 위하여 내성법을 사용하였던 초기 심리학파는?

- ① 구조주의
- ② 기능주의
- ③ 행동주의
- ④ 인본주의

76. 정신상태검사(mental status examination)에서 파악하는 항목과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 감각기능: 의식상태, 주의력, 기억력 등
- ② 인지기능: 내담자의 치료 동기의 파악
- ③ 지각장애: 착각, 환각의 유무 등
- ④ 지남력: 시간, 장소, 사람 지남력

77. 행동치료에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평가와 치료가 직접적으로 연관된다.
- ② 문제 행동의 기저 원인에 중요성을 둔다.
- ③ 모든 사례에 동일한 기법을 적용하기보다는 개별화된 평가와 개입을 한다.
- ④ 평가와 치료 절차가 구체적이고 분명하다.

78. Bergan과 Kratochwill은 임상심리사의 자문과 관련하여 10가지 자문 모형을 밝히고, 자문 과정을 5가지 핵심 문제로 분류하였는데, 다음 중 핵심문제가 아닌 것은?

- ① 자문가의 책임
- ② 목표
- ③ 초기 면담
- ④ 지식 기반

79. 체계적 둔감절차의 핵심적인 요소는?

- ① 이완
- ② 공감
- ③ 해석
- ④ 인지의 재구조화

80. ()에 알맞은 방어기제는?

중현이는 선생님께 꾸중을 들어 기분이 매우 좋지 않았다. 집으로 돌아온 중현이에게 동생이 밥을 먹을 것인지 묻자, “네가 상관할 거 없잖아!”라고 소리를 질렀다. 중현이가 사용하고 있는 방어기제는 ()이다.

- ① 행동화
- ② 투사
- ③ 전위
- ④ 동일시

[제5과목 : 심리상담]**81. 도박중독에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?**

- ① 원하는 흥분을 얻기 위해 액수를 낮추면서 도박을 한다.
- ② 정상적인 사회생활에는 큰 지장이 없다.
- ③ 도박을 중단하면 금단중상이 나타나며, 심하면 자살을 초래한다.
- ④ 도시보다 시골지역에 많으며, 평생 유병률은 5% 정도로 보고되고 있다.

82. 상담자가 상담과 관련하여 내담자에게 제공해야 할 정보와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상담시간과 요금
- ② 상담자의 특성과 훈련
- ③ 상담을 거부할 수 있는 권리
- ④ 비밀보장의 한계

83. 집단상담에서 집단응집력에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응집력이 높은 집단은 자기개방을 많이 한다.
- ② 응집력은 집단상담의 성공에 매우 중요한 요소가 된다.
- ③ 응집력이 낮은 집단은 지금-여기에서의 사건이나 일에 초점을 맞춘다.
- ④ 응집력이 높은 집단은 집단의 규범이나 규칙을 지키지 않는 다른 집단원을 제지한다.

84. 사회공포증 극복을 위한 집단치료 프로그램에서, 불안을 유발하기 때문에 지금까지 피해왔던 상황을 더 이상 회피하지 않고 그 상황에 직면하게 하는 일종의 행동치료기법은?

- ① 노출훈련
- ② 역할연기
- ③ 자동적 사고의 인지재구성 훈련
- ④ 역기능적 신념에 대한 인지재구성 훈련

85. 진로상담의 일반적인 원리와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 만성적인 미결정자의 조기발견에 특히 유념해야 한다.
- ② 경우에 따라서는 심리상담을 병행하면 더욱 효율적이다.
- ③ 최종결정과 선택은 상담자가 분명하게 정해주어야 한다.
- ④ 내담자에 대한 기본적인 신뢰와 공감적 이해는 진로상담에서도 중요하다.

86. 접촉, 지금-여기, 자각과 책임감 등을 중시하는 치료이론은?

- ① 인간중심적 치료
- ② 게슈탈트 치료
- ③ 정신분석
- ④ 실존치료

94. 전화상담이 가장 효과적인 경우는?

- ① 심한 정신질환이 있는 경우
- ② 만성적인 문제가 있는 경우
- ③ 스스로 문제를 해결할 능력이 없는 경우
- ④ 남과 얼굴대하기를 꺼려하는 경우

95. 인지 행동상담에서 사용하는 스트레스 점종방법이 아닌 것은?

- ① 재구조화 연습
- ② 이완훈련
- ③ 심호흡 연습
- ④ 인지 재교육

96. 심리재활 프로그램인 집단치료가 가지는 장점과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 다른 집단 구성원에게 도움을 준다는 만족감을 경험할 수 있다.
- ② 효과적인 대화기술을 익히는 기회가 된다.
- ③ 고민하는 비슷한 문제들에 대해 다양한 해결책을 살펴볼 수 있다.
- ④ 항상 참여할 수 있고 자유롭게 다른 일정과 병행할 수 있다.

97. 상담 초기 단계에서 사용하기에 가장 적합한 기법은?

- ① 경청
- ② 자기개방
- ③ 피드백
- ④ 감정의 반영

98. 집단상담에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 집단 크기, 기간, 집단성격, 프로그램 등을 미리 결정해야 한다.
- ② 집단상담에서는 개인상담에 있는 점수면접과 같은 단계는 생략된다.
- ③ 집단상담에서 상담자는 조연을 사용해서는 안된다.
- ④ 만성적 우울증을 가진 내담자로 이루어진 집단은 자조집단에 어울린다.

99. 다음 심리치료에서 사용된 상담 기술은?

내담자 : 당신은 나에 대해 모든 것을 아는 것처럼 행동하지만, 당신은 아무것도 몰라요.
상담자 : 내가 당신의 아버지를 기억나게 하는 것은 아닌지 의문스럽군요. 당신은 아버지가 모든 것을 아는 것처럼 행동한다고 말했었지요.

- ① 재진술
- ② 직면(도전)
- ③ 해석
- ④ 감정반영

100. 게슈탈트 상담에 대한 중요한 비판점으로 가장 적합한 것은?

- ① 성격의 인지적 측면을 무시한다.
- ② 내담자의 삶을 무시하거나 가치를 떨어뜨릴 수 있다.
- ③ 자신들의 사고를 강요할 수도 있다.
- ④ 내담자가 심리적 손상을 입을 가능성이 많다.

1	4	2	3	3	1	4	3	5	3
6	3	7	4	8	1	9	4	10	2
11	2	12	4	13	4	14	2	15	1
16	3	17	3	18	3	19	3	20	1
21	4	22	4	23	2	24	4	25	3
26	3	27	1	28	3	29	1	30	1
31	3	32	3	33	2	34	3	35	2
36	3	37	4	38	4	39	1	40	3
41	2	42	4	43	1	44	4	45	4
46	2	47	1	48	1	49	2	50	4
51	2	52	3	53	3	54	4	55	3
56	3	57	3	58	3	59	2	60	1
61	3	62	2	63	2	64	1	65	3
66	4	67	4	68	2	69	4	70	3
71	2	72	2	73	3	74	2	75	1
76	2	77	2	78	3	79	1	80	3
81	3	82	2	83	3	84	1	85	3
86	2	87	2	88	3	89	2	90	3
91	1	92	3	93	1	94	4	95	4
96	4	97	1	98	1	99	3	100	1