

5. 자신의 성공은 자기가 잘한 것 때문이라고 하고, 자신의 실패에 대해서는 자신의 책임을 모면하려고 하는 사람이 있다면, 이 사람이 보이는 성향은?

- ① 암묵적 자기중심주의(implicit egotism)
- ② 자기애(narcissism)
- ③ 자기봉사적 편향(self-serving bias)
- ④ 성명-글자 효과(name-letter effect)

6. '역지사지'라는 말은 특정사건이나 현상을 타인의 입장에서 사고하는 것을 의미한다. 역지사지를 할 수 있는 능력을 Piaget의 인지발달 단계와 관련시켰을 때 가장 적합한 설명은?

- ① 역지사지 능력은 대상영속성 개념을 형성하는 단계가 되어야 가능하다.
- ② 수에 대한 보존개념을 획득하기 전 단계에서 역지사지 능력이 가능하게 된다.
- ③ 눈으로 보고 만질 수 있는 사물들 간의 관계와 규칙성을 이해하고 조작이 가능한 단계에서 역지사지 능력을 갖출 수 있다.
- ④ 역지사지 능력은 추상적인 연역적 사고능력이 가능한 단계에서만 갖출 수 있다.

7. 'IB-MKB-SMB-C5.1-68.1-5'배열을 외우기는 힘들지만, 이를 'IBM-KBS-MBC-5.16-8.15' 배열로 재구성하면 외우기가 쉬워진다. 이와 같이 정보를 재부호화하여 하나로 묶는 것은?

- ① 암송 ② 부호화 ③ 청킹(chunking) ④ 활동기억

8. 과자의 양이 적다는 어린 꼬마에게 모양을 다르게 했더니 많다고 좋아한다. 이 아이의 논리적 사고를 Piaget 이론으로 본다면 무엇에 해당하는가?

- ① 자기중심성의 문제 ② 대상영속성의 문제
- ③ 보존개념의 문제 ④ 가설-연역적 추론의 문제

9. 비확률적 표집방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 목적 표집 ② 편의 표집 ③ 할당 표집 ④ 단순 표집

10. 불안이 수행에 미치는 영향을 알아보는 실험에서 종속변인은?

- ① 피험자의 수행 ② 불안의 원인
- ③ 불안의 수준 ④ 피험자의 연령

11. 대뇌의 우반구가 손상되었을 때 주로 영향을 받게 될 능력은?

- ① 통장잔고 점검 ② 말하기
- ③ 얼굴 인식 ④ 논리적 문제해결

18. A씨가 할머니 댁에 방문하였을 때, 음료수를 바닥에 엎질러서 할머니에게 혼났던 것을 기억하고 있다. 이러한 기억을 지칭하는 것은?

- ① 의미 기억 ② 암묵 기억 ③ 절차 기억 ④ 일화 기억

19. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

척도상의 대표적 수치를 의미하며 평균, 중앙치, 최빈치가 그 예이다.

- ① 빈도분포값 ② 추리통계값
③ 집중경향값 ④ 변산측정값

20. 성격이란 삶과 죽음이 교차하는 현실 속에서 그 사람이 내리는 선택과 결정에 의해 좌우되는 것이라고 보는 관점은?

- ① 정신분석적 관점 ② 인본주의적 관점
③ 실존주의적 관점 ④ 현상학적 관점

제2과목 : 이상심리학

21. 발달 정신병리에서 성별, 기질, 부모의 불화, 부모의 죽음이나 이별, 긍정적 학교 경험의 부족 등은 어떤 요인에 해당하는가?

- ① 보호 요인 ② 통제 요인 ③ 탄력성 ④ 위험 요인

22. 허위성 장애에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 남성보다 여성에게 더 흔하다.
- ② 정확한 원인은 잘 알려져 있지 않다.
- ③ 외부적 보상이 없음에도 불구하고 증상을 허위로 만들어낸다.
- ④ 청소년기에 주로 발병된다.

23. 사고의 비약(flight of ideas) 증상에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조현병의 망상적 사고
- ② 우울증의 자살충동적 사고
- ③ 조증의 대화할 때 보이는 급격한 주제의 전환
- ④ 신경인지장애의 지리멸렬한 사고

24. 다음은 어떤 장애인가?

A군은 두통과 복통을 많이 호소하여 어머니와 함께 최근 소아과 검진을 받았는데, 별 문제가 없다는 판정을 받았다. 그러나 A군은 아침에 어머니와 헤어져 학교에 가는 것을 매우 힘들어 하며, 신체적 문제를 핑계로 학교에서 자주 조퇴하였다.

- ① 선택적 함구증
- ② 반응성 애착장애
- ③ 분리불안 장애
- ④ 기분조절불능장애

25. 인지치료 접근에서 사용하는 개입 방안이 아닌 것은?

- ① 협력적 경험주의
- ② 소크라테스식 대화법
- ③ ABC 사고기록지
- ④ 정서적 추론

26. 성격장애의 하위 범주 중 극적이고 변덕스러운 행동을 특징적으로 나타내는 장애군에 속하는 것은?

- ① 회피성 성격장애
- ② 강박성 성격장애
- ③ 의존성 성격장애
- ④ 경계성 성격장애

27. 도박장애가 있는 사람들의 특징이 아닌 것은?

- ① 뇌 보상중추에서 도파민 활동성과 작용이 고조된다.
- ② 물질사용장애와는 다르게 금단증상과 내성이 없다.
- ③ 충동적이며 새로운 자극을 추구하는 특성을 가진다.
- ④ 스트레스를 받거나 괴로울 때 도박을 더 많이 한다.

28. DSM-5에서 해리성 정체성 장애의 진단적 특징이 아닌 것은?

- ① 자기감각과 행위 주체감의 갑작스러운 변화
- ② 반복적인 해리성 기억상실
- ③ 경험성 기억의 퇴보
- ④ 알코올 등의 직접적인 생리적 효과로 일어나는 경우도 포함

29. 공황장애에 관한 설명으로 적절한 것은?

- ① 공황발작은 공황장애의 고유한 증상이다.
- ② 여성보다 남성에게서 2~3배 더 많은 것으로 알려져 있다.
- ③ 청소년 후기와 30대 중반에서 가장 많이 발병한다.
- ④ 대개 나이가 들면서 자연스럽게 치유된다.

30. 강박 및 관련장애에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 강박장애의 가장 흔한 주제는 더러움 또는 오염이다.
- ㄴ. 강박장애를 가진 사람들 중 일부는 강박사고만 또는 강박행동만 경험한다.
- ㄷ. 강박 관련 장애로 수집광, 신체이형장애, 피부뜯기 장애가 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 외상후스트레스 장애의 대표적인 지역사회 개입접근인 심리경험 사후보고에 관한 설명으로 적절한 것은?

- ① EMDR보다 효과적이다.
- ② 특정 고위험군 환자들에게 효과적이다.
- ③ 청소년에게만 효과적이다.
- ④ 전문가에 의해 행해졌을 때만 효과적이라고 보고된다.

32. 성격장애에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 정신장애와 동반되어 나타날 수 있다.
- ② 현실검증력의 장애가 있다.
- ③ 고정된 행동양식이 개인 생활과 사회생활 전반에 넓게 퍼져 있다.
- ④ 대개 청소년기나 성인기 초기에 나타난다.

33. DSM-5에 새로 생긴 장애는?

- ① 의사소통장애 ② 아스퍼거 증후군
- ③ 아동기 발병 유창성장애 ④ 사회적 의사소통장애

40. 주요 신경인지장애와 경도 신경인지장애의 감별진단 기준으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기억과 학습 감퇴 정도
- ② 성격의 변화 정도
- ③ 언어능력의 감퇴 정도
- ④ 독립적 생활의 장애 정도

제3과목 : 심리검사

41. K-WAIS-IV에서 처리속도가 점수에 긴밀하게 영향을 주는 소검사는?

- ① 숫자
- ② 퍼즐
- ③ 지우기
- ④ 무게비교

42. 심리평가를 위해 수행되는 면담에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 면담은 구조화할 수 없다는 단점이 있다.
- ② 면담은 평가를 하기 위한 목적으로 하는 것이라 치료적인 효과는 없다.
- ③ 면담에서는 신뢰도와 타당도를 크게 고려하지 않아도 된다는 장점이 있다.
- ④ 면담자가 피면담자에 대한 전반적인 인상을 형성한 후 그것에 준해 다른 관련특성을 추론하는 경향을 할로(halo) 효과라고 한다.

43. MMPI-2 임상척도와 Kuncze와 Anderson(1984)이 제안한 기본 차원 간의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 1번 척도 - 표현
- ② 4번 척도 - 주장성
- ③ 8번 척도 - 상상력
- ④ 9번 척도 - 열의

44. 대상 및 사건에 대한 학습을 의미하는 서술기억(declarative memory)의 하위 영역에 포함되는 것은?

- ① 절차기억(procedural memory)
- ② 암묵적 기억(implicit memory)
- ③ 일화기억(episodic memory)
- ④ 특정기억(particular memory)

45. 지적장애 진단을 위한 IQ 기준과 이 장애에 해당되는 사람의 비율은?

- ① IQ 60 미만, 전체인구의 약 3% 이하
- ② IQ 65 미만, 전체인구의 약 3% 이하
- ③ IQ 70 미만, 전체인구의 약 3% 이하
- ④ IQ 70 미만, 전체인구의 약 5% 이하

46. 다음 MMPI-2 프로파일과 가장 관련이 있는 진단은?

L=56, F=78, K=38		
1(Hs)=56	2(D)=58	3(Hy)=54
4(Pd)=53	5(Mf)=54	6(Pa)=76
7(Pt)=72	8(Sc)=73	9(Ma)=55
0(Si)=66		

- ① 우울증
- ② 품행장애
- ③ 전환장애
- ④ 조현병

47. 개인용 지능검사와 집단용 지능검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 집단용 지능검사의 경우, 검사의 시행과 절차가 간편하기 때문에 검사자는 피검사자의 검사행동에 관한 자료수집이 용이하다.
- ② 개인용 지능검사나 집단용 지능검사에서 검사실시와 절차에 대한 검사자의 본질적인 역할은 동일하다.
- ③ 피검사자는 개인용 지능검사의 경우에는 사람에게 반응하지만, 집단용 지능검사의 경우에는 주어진 문항에 반응한다고 볼 수 있다.
- ④ 개인용 지능검사나 집단용 지능검사나 피검사자가 반응하는 데 요구되는 인지작용은 질적인 측면에서 차이가 없다.

48. 주제통각검사(Thematic Apperception Test : TAT)의 실시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 수검자에게 24장의 카드를 실시한다.
- ② 카드를 보여주고, 각 그림을 보면서 될 수 있는 대로 연극적인 장면을 만들어 보라고 지시한다.
- ③ 수검자의 반응이 매우 피상적 이고 기술적인 경우라도 검사자는 개입하지 않고 다음 반응으로 넘어간다.
- ④ 수검자가 “이 사람은 남자인가요? 여자인가요?” 라고 묻는 경우, 검사 요강을 참고하여 성별을 알려준다.

49. 신경심리검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 치료 효과의 평가에 사용할 수 있다.
- ② 우울장애와 치매상태를 감별해 줄 수 있다.
- ③ 가벼운 초기 뇌손상의 진단에는 효과적이지 못하다.
- ④ 신경심리검사의 해석에 성격검사 결과를 참조한다.

50. 성격검사의 구성타당도를 평가하는 방법이 아닌 것은?

- ① 성격검사의 요인구조를 분석한다.
- ② 다른 유사한 성격을 측정하는 검사와의 상관을 구한다.
- ③ 관련 없는 성격을 측정하는 검사와의 상관을 구한다.
- ④ 전문가들로 하여금 검사 내용을 판단하게 한다.

51. K-WAIS-IV 소검사 중 같은 유형의 소검사에 해당하지 않는 것은?

- ① 상식, 공통성
- ② 퍼즐, 무게비교
- ③ 지우기, 기호쓰기
- ④ 동형찾기, 무게비교

52. MMPI-2에서 F척도 상승이 기대되지 않는 경우는?

- ① 고의적으로 나쁘게 보이려는 태도로 응답했을 경우
- ② 자신의 약점을 고의적으로 숨기려는 강한 방어적 태도로 응답했을 경우
- ③ 대부분의 문항에 대해 '그렇다' 혹은 '아니다'의 한 방향으로만 응답했을 경우
- ④ 혼란, 망상적 사고 또는 다른 정신병적 과정을 겪고 있는 사람이 응답했을 경우

53. 시공간 처리능력을 평가하기에 적합하지 않은 검사는?

- ① 토막짜기
- ② 벤더 도형 검사
- ③ 선로 잇기 검사
- ④ 레이 복합 도형 검사

54. 연령이 69세인 노인환자의 신경심리학적 평가에 적합하지 않은 검사는?

- ① SNSB
- ② K-VMI-6
- ③ Rorschach
- ④ K-WAIS-IV

55. K-WISC-IV에서 일련의 숫자와 글자를 읽어주고 숫자는 많아지는 순서로, 글자는 가나다 순서로 각각 말하게 하는 과제는?

- ① 숫자
- ② 선택
- ③ 행렬추리
- ④ 순차연결

56. 다음에서 설명하는 검사는?

유아 및 학령전 아동의 발달 과정을 체계적으로 측정하기 위한 최초의 검사로서, 표준 놀이기구와 자극 대상에 대한 유아의 반응을 직접 관찰하며, 의학적 평가나 신경학적 원인에 의한 이상을 평가하기 위해 사용된다.

- ① Gesell 의 발달 검사
- ② Bayley의 영아발달 척도
- ③ 시지각 발달 검사
- ④ 사회성숙도 검사

57. 신뢰도의 추정방법 중 반분신뢰도의 장점은?

- ① 검사의 문항수가 적어도 된다.
- ② 반분된 검사가 동형일 필요가 없다.
- ③ 단 1회의 시행으로 신뢰도를 구할 수 있다.
- ④ 속도검사의 신뢰도를 추정하는데 적합하다.

58. 신경심리평가 중 주의력 및 정신적 추적능력을 평가할 수 있는 검사가 아닌 것은?

- ① Wechsler 지능검사의 기호쓰기 소검사
- ② Wechsler 지능검사의 숫자 소검사
- ③ Trail Making Test
- ④ Wisconsin Card Sorting Test

59. 성취도검사의 일종인 기초학습기능검사가 평가하기 어려운 영역은?

- ① 독해력
- ② 계산능력
- ③ 철자법 능력
- ④ 공간추론 능력

60. 심리검사의 윤리적 문제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 검사자들은 검사제작의 기술적 측면에만 관심을 가질 필요가 있다.
- ② 제대로 자격을 갖춘 검사자만이 검사를 사용해야 한다는 조건은 부당한 검사사용으로부터 피검자를 보호하기 위한 조치이다.
- ③ 검사자는 규준, 신뢰도, 타당도 등에 관한 기술적 가치를 평가할 수 있어야 한다.
- ④ 심리학자에게 면허와 자격에 관한 법을 시행하는 것은 직업적 윤리 기준을 세우기 위함이다.

제4과목 : 임상심리학

61. 집단개업 활동을 할 때 임상심리 전문가들이 가장 주의해야 할 사항은?

- ① 직업윤리 및 활동에 대해 개인적인 책임을 져야한다.
- ② 직업적인 경쟁과 성격적인 충돌 가능성이 있다.
- ③ 개인의 독립적인 사무실의 확보 비용이 든다.
- ④ 개인적이고 직업적인 고립감을 경험한다.

62. 두뇌기능의 국제화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특정 인지능력은 국부적인 뇌 손상에 수반되는 한정된 범위의 인지적 결함으로부터 발생한다고 본다.
- ② Broca 영역은 좌반구 측두엽 손상으로 수용적 언어 결함과 관련된다.
- ③ Wernicke 영역은 좌반구 전두엽 손상으로 표현 언어 결함과 관련된다.
- ④ MRI 및 CT가 개발되었으나 기능 문제 확인에는 외과적 검사가 이용된다.

63. 정신분석치료의 주요 개념 및 기법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전이 ② 저항 ③ 과제 ④ 훈습

64. 근육 긴장을 이완시키고, 심장의 박동을 조정하고, 혈압을 통제하는 훈련을 받는 것은?

- ① 바이오 피드백 ② 행동적인 대처방식
- ③ 문제 중심의 대처기술 ④ 정서 중심의 대처기술

65. 아동 또는 청소년의 폭력비행을 상담할 때 부모를 통한 개입법으로 가장 효과적인 것은?

- ① 자녀가 반사회적 행동을 하면 심하게 야단을 치게 한다.
- ② 사회에서 용인되는 행동을 보이면 일관되게 보상을 주도록 한다.
- ③ 가족모임을 열어서 훈계를 하도록 한다.
- ④ 폭력을 휘둘렀을 때마다 부모가 자녀를 매로 다스리게 한다.

66. 합리적 정서치료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Aaron Beck이 개발했다.
- ② 환자가 사물에 대해 생각하는 방식을 바꿈으로써 행동 변화를 목적으로 한다.
- ③ 해석은 문제가 되는 감정적, 행동적 결과(C)를 결정하는 사건과 상황(A)에 대한 믿음(B)이다.
- ④ 이 치료의 기본목적은 사람들이 자신이 가진 비논리적 사고에 직면하게 만드는 것이다.

67. 현대 임상심리학 발전에 가장 큰 영향을 준 역사적 사건은?

- ① Binet의 지능검사 개발
- ② MMPI 의 개발
- ③ 미국심리학회 설립
- ④ 제 1·2차 세계대전

68. Burish(1984)는 객관적 성격검사 제작에 관한 접근들을 규명하여 기술하였다. 다음 중 이 접근법에 해당하지 않는 것은?

- ① 외적 준거 접근
- ② 내적 구조 접근
- ③ 내적 내용 접근
- ④ 외적 차원 접근

69. 다음 중 비밀유지의 의무가 제외될 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 자살 가능성이 있는 내담자
- ② 범죄를 저지를 가능성이 있는 내담자
- ③ 강도, 강간 등 범죄 피해자
- ④ 아동학대의 사례

70. 체중 조절을 위하여 식이요법을 시행하는 사람이 매일 식사의 시간, 종류, 양과 운동량을 구체적으로 기록하고 있다면 이는 어떤 행동 관찰의 방법인가?

- ① 자기-감찰(self-monitoring)
- ② 통계적인 평가
- ③ 참여 관찰(participant observation)
- ④ 비참여 관찰(non-participant observation)

71. 심리사회적 또는 환경적 스트레스와 생물학적 또는 기타 취약성의 상호작용이 질병을 일으킨다는 조망은?

- ① 상호적 유전-환경 조망
- ② 병적 소질-스트레스 조망
- ③ 사회적 조망
- ④ 생물학적 조망

72. 실존적 접근의 심리치료는?

- ① 인지치료
- ② 의미치료
- ③ 자기교습훈련
- ④ 합리적 정서행동치료

73. 투쟁-도피(fight-flight) 반응과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 호흡의 증가
- ② 땀 분비 감소
- ③ 소화기능 저하
- ④ 동공 팽창

79. 다음에 해당하는 장폐 유형은?

원치 않은 성적인 생각, 난폭하거나 공격적인 충동, 도덕관념과 배치되는 비윤리적인 심상 등과 같은 불편한 생각이 자꾸 떠올라 무기력하고 괴로워하거나 마치 내면적 논쟁을 하듯이 대응한다.

- ① 공황장애 ② 강박장애 ③ 성적불쾌감 ④ 우울증

80. 임상심리학자의 고유한 역할과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사례관리 ② 심리평가 ③ 심리치료 ④ 심리학적 자문

제5과목 : 심리상담

81. 위기상담과정에 사용되는 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 위기와 개인적 자원의 평가
ㄴ. 가능한 해결책을 모색하기
ㄷ. 개입에 관한 결정
ㄹ. 문제에 대한 분명한 정서적, 인지적 이해
ㅁ. 개입의 평가에 관한 계획
ㅂ. 개입의 실행에 관한 계획

- ① ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅁ → ㅂ
② ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅂ → ㅁ
③ ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅂ → ㅁ
④ ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㅂ

82. 실존주의 상담 접근에서 제시한 인간의 기본조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 인간은 누구나 자기인식 능력을 가지고 있다.
- ② 자신의 정체감 확립과 타인과 의미 있는 관계를 수립한다.
- ③ 인간은 완성을 추구하는 경향이 있다.
- ④ 죽음이나 비존재에 대해 인식한다.

83. 다음 중 게슈탈트 심리치료에서 강조하는 것이 아닌 것은?

- ① 지금-여기
- ② 내담자의 억압된 감정에 대한 해석
- ③ 미해결 과제 또는 회피
- ④ 환경과의 접촉

84. 합리적-정서적 치료 상담의 ABCDE과정 중 D가 의미하는 것은?

- ① 논박 ② 결과 ③ 왜곡된 신념 ④ 효과

85. 알코올중독자 상담에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가족을 포함하여 타인의 방해를 받지 않기 위하여 비밀리에 상담한다.
- ② 치료 초기 단계에서 술과 관련된 치료적 계약을 분명히 한다.
- ③ 문제 행동에 대한 행동치료를 병행할 수 있다.
- ④ 치료후기에는 재발가능성을 언급한다.

86. Krumboltz가 제시한 상담의 목표에 해당하지 않는 것은?

- ① 내담자가 요구하는 목표이어야 한다.
- ② 상담자의 도움을 통해 내담자가 달성할 수 있는 목표이어야 한다.
- ③ 내담자가 상담목표 성취의 정도를 평가할 수 있어야 한다.
- ④ 모든 내담자에게 동일하게 적용될 수 있는 목표이어야 한다.

87. 가족진단시 사용되는 질문지식 사정도구 중 응집력과 적응력의 두 차원을 주로 사용하는 모델은?

- ① 비버즈(beavers) 모델
- ② 씨컴플렉스(circumplex) 모델
- ③ 맥매스터 (mcmaster) 모델
- ④ 의사·소통(communication) 모델

88. Yalom이 제시한 상호역동적인 치료집단을 위해 적절한 구성원 수는?

- ① 4~5명 ② 7~8명
- ③ 10~11명 ④ 12~13명

89. 가출 충동에 직면하고 있는 청소년을 상담할 때 상담자가 취해야 할 행동으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 내담자의 가출 충동을 적극적으로 수용한다.
ㄴ. 가출 동기와 목적 및 가출 가능성을 평가한다.
ㄷ. 가출 후의 어려움과 관련된 정보를 제공한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

90. 최초로 심리학 지식을 상담이나 치료의 목적으로 활용하려고 심리클리닉을 펜실베이니아 대학교에 처음 설립한 사람은?

- ① 위트머(Witmer) ② 볼프(Wolpe)
- ③ 스키너(Skinner) ④ 로저스(Rogers)

91. 아이가 떼를 쓰고 나서 부모에게 혼나면 혼날수록, 그 아이는 떼를 점점 더 심하게 썼다. 이때 부모가 혼내는 것이 아이가 떼를 쓰는데 어떤 역할을 한 것인가?

- ① 정적강화 ② 부적강화
- ③ 정적처벌 ④ 부적처벌

92. 공부를 하지 않는 문제행동을 가진 내담자의 학습태도를 바꾸기 위해 상담자가 시도하는 접근방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자각 ② 대치
- ③ 모방 ④ 변화를 위한 긍정적인 자극

93. 약물중독의 진행 단계로 옳은 것은?

- ① 실험적 사용단계 → 사회적 사용단계 → 의존단계 → 남용단계
- ② 실험적 사용단계 → 사회적 사용단계 → 남용단계 → 의존단계
- ③ 사회적 사용단계 → 실험적 사용단계 → 남용단계 → 의존단계
- ④ 사회적 사용단계 → 실험적 사용단계 → 의존단계 → 남용단계

◦ 2018년 정기 기사 1회 필기 - 임상심리사2급 2교시 A형

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
답안	2	3	4	2	3	3	3	3	4	1
번호	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
답안	3	3	4	2	3	4	3	4	3	3
번호	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
답안	4	4	3	3	4	4	2	4	3	4
번호	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
답안	2	2	4	1	2	3	3	4	3	2
번호	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
답안	3	4	1	3	3	4	3	2	3	4
번호	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
답안	4	2	3	3	4	1	3	4	4	1
번호	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
답안	2	1	3	1	2	1	4	4	3	1
번호	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
답안	2	1	3	1	2	1	4	4	3	1
번호	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
답안	2	2	2	1	3	1	1	2	2	1
번호	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
답안	2	3	2	1	1	4	2	2	4	1
번호	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
답안	1	3	2	3	3	1	2	2	3	4